

Feuille d'exercice n° 02 : **Fonctions usuelles**

Exercice 1 (✎) Factoriser les expressions suivantes, puis déterminer le tableau de signes de chacune.

1) $f(x) = x^3 - 2x^2 - 11x + 12$

3) $\varphi(x) = x + 8 - \frac{16}{x-7}$

2) $g(x) = x \ln(x) - x - 2 \ln(x) + 2$

4) $\psi(x) = xe^x + 3e^x - 2x - 6$

Exercice 2 (✎) Dériver et dresser les tableaux de variations des fonctions suivantes.

1) $f : x \mapsto x^2 e^x$

3) $\varphi : x \mapsto \ln|x|$

2) $g : x \mapsto \frac{x}{\ln(x) - 1}$

4) $\psi : x \mapsto 3 \ln|x-2| + 2 \ln|x+3|$

Exercice 3 (✎)

1) Montrer que la somme de deux applications croissantes est croissante.

2) La somme de deux applications monotones est-elle nécessairement monotone ?

3) Le produit de deux applications croissantes est-il nécessairement une application croissante ?

Exercice 4 (✎) Déterminer le domaine de définition, de $g \circ f$ dans chaque cas.

1) $f : x \mapsto 1 + \frac{3}{x-5}$ et $g = \sqrt{\cdot}$.

3) $f : x \mapsto x + 3 \ln(x)$ et $g = \exp$.

2) $f = \cos$ et $g : x \mapsto \frac{1}{x}$

4) $f = \sin$ et $g = \ln$.

Exercice 5 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f \circ f$ est croissante tandis que $f \circ f \circ f$ est strictement décroissante. Montrer que f est strictement décroissante.

Exercice 6 Résoudre dans \mathbb{R}^2 le système $\begin{cases} 2^{3x+2y} = 5 \\ 4^{2x} = 2^{2y+3} \end{cases}$.

Exercice 7 Résoudre l'équation $\ln \frac{x+3}{4} = \frac{1}{2}(\ln x + \ln 3)$.

Exercice 8 (✎🚲) Tracer les courbes représentatives des fonctions suivantes.

1) $f : x \mapsto \sin(\text{Arcsin } x)$

2) $g : x \mapsto \text{Arcsin}(\sin x)$

Exercice 9 (✎) Simplifier les expressions suivantes.

- 1) $\text{Arcsin}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 3) $\text{Arccos}\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right)$ 5) $\text{Arctan}\left(\tan\frac{3\pi}{4}\right)$ 7) $\tan(\text{Arcsin } x)$
 2) $\text{Arccos}\left(\cos\frac{2\pi}{3}\right)$ 4) $\text{Arccos}(\cos 4\pi)$ 6) $\sin(\text{Arccos } x)$ 8) $\cos(\text{Arctan } x)$

Exercice 10 (🚲) Démontrer les inégalités suivantes.

- 1) Pour tout $a \in]0, 1[$, $\text{Arcsin } a < \frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$.
 2) Pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$, $\text{Arctan } a > \frac{a}{1+a^2}$.

Exercice 11

- 1) Soit $x \in [0, \pi/8[$. Exprimer $\tan(4x)$ en fonction de $\tan(x)$.
 2) En déduire la formule de Machin : $\frac{\pi}{4} = 4 \text{Arctan } \frac{1}{5} - \text{Arctan } \frac{1}{239}$.

Remarque : John Machin a pu calculer 100 décimales de π à la main en 1706 grâce à cette relation.

Exercice 12




FIGURE 1 – La statue

Une statue de hauteur s est placée sur un piédestal de hauteur p . À quelle distance du pied de la statue un observateur (dont la taille est supposée négligeable) doit-il se placer pour la voir sous un angle maximal (*i.e.* pour avoir θ maximal, avec les notations de la figure 1) ?

Exercice 13 (🚲) Sur quelle partie de \mathbb{R} est définie l'équation $\text{Arccos } x = \text{Arcsin}(1-x)$? La résoudre.

Exercice 14 On définit les deux fonctions f et g par $f : x \mapsto \text{Arctan}\left(\frac{1}{2x^2}\right)$ et $g : x \mapsto \text{Arctan}\left(\frac{x}{x+1}\right) - \text{Arctan}\left(\frac{x-1}{x}\right)$.

- 1) Déterminer leurs ensembles de définition.
 2) Calculer, lorsque cela est possible, leurs dérivées.
 3) Que peut-on en déduire concernant $f(x)$ et $g(x)$? Donner le maximum de précisions.
 4) Tracer les courbes représentatives de f et de g (sur un même schéma).

Exercice 15 (🚲) Calculer $\text{Arctan } \frac{1}{2} + \text{Arctan } \frac{1}{5} + \text{Arctan } \frac{1}{8}$.

Exercice 16 (🏹) Résoudre : $\text{Arcsin } 2x = \text{Arcsin } x + \text{Arcsin } (x\sqrt{2})$.

Exercice 17 Soit la fonction $f : \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\rightarrow \mathbb{R}$.
 $x \mapsto \ln \left(\tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right)$

Montrer que f est bien définie et que l'on a les relations suivantes, pour tout $x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$.

1) $\text{th} \left(\frac{f(x)}{2} \right) = \tan \left(\frac{x}{2} \right)$

3) $\text{ch} (f(x)) = \frac{1}{\cos(x)}$

2) $\text{th}(f(x)) = \sin(x)$

4) $\text{sh} (f(x)) = \tan(x)$.

Exercice 18 Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Résoudre l'équation $a \text{ch } x + b \text{sh } x = 0$.

