

PRIMITIVES USUELLES

Dans ce tableau, $n \in \mathbb{N}$, $p \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$, $q \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ et $a \in \mathbb{R}_+^*$. Le domaine de validité désigne les intervalles sur lesquels les primitives des fonctions réelles considérées sont valides.

Fonction	Primitive	Domaine de validité
$x \mapsto x^n$	$x \mapsto x^{n+1}/(n + 1)$	\mathbb{R}
$x \mapsto x^p$	$x \mapsto x^{p+1}/(p + 1)$	\mathbb{R}_+^* ou \mathbb{R}_-^*
$x \mapsto x^q$	$x \mapsto x^{q+1}/(q + 1)$	\mathbb{R}_+^*
$x \mapsto 1/x$	$x \mapsto \ln x $	\mathbb{R}_+^* ou \mathbb{R}_-^*
$x \mapsto e^x$	$x \mapsto e^x$	\mathbb{R}
$x \mapsto \sin x$	$x \mapsto -\cos x$	\mathbb{R}
$x \mapsto \cos x$	$x \mapsto \sin x$	\mathbb{R}
$x \mapsto \tan x$	$x \mapsto -\ln \cos x $	$]-\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$
$x \mapsto \cotan x$	$x \mapsto \ln \sin x $	$]k\pi, (k + 1)\pi[, k \in \mathbb{Z}$
$x \mapsto 1/\sin x$	$x \mapsto \ln \tan(x/2) $	$]k\pi, (k + 1)\pi[, k \in \mathbb{Z}$
$x \mapsto 1/\cos x$	$x \mapsto \ln \tan(x/2 + \pi/4) $	$]-\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$
$x \mapsto 1/\sin^2 x$	$x \mapsto -\cotan x$	$]k\pi, (k + 1)\pi[, k \in \mathbb{Z}$
$x \mapsto 1/\cos^2 x$	$x \mapsto \tan x$	$]-\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$
$x \mapsto \sh x$	$x \mapsto \ch x$	\mathbb{R}

$x \mapsto \operatorname{ch} x$	$x \mapsto \operatorname{sh} x$	\mathbb{R}
$x \mapsto \operatorname{th} x$	$x \mapsto \ln(\operatorname{ch} x)$	\mathbb{R}
$x \mapsto \coth x$	$x \mapsto \ln \operatorname{sh} x $	$\mathbb{R}_+^* \text{ ou } \mathbb{R}_-^*$
$x \mapsto 1/\operatorname{sh} x$	$x \mapsto \ln \operatorname{th} (x/2) $	$\mathbb{R}_+^* \text{ ou } \mathbb{R}_-^*$
$x \mapsto 1/\operatorname{ch} x$	$x \mapsto 2 \operatorname{Arctan}(\operatorname{e}^x)$	\mathbb{R}
$x \mapsto 1/\operatorname{sh}^2 x$	$x \mapsto -\coth x$	$\mathbb{R}_+^* \text{ ou } \mathbb{R}_-^*$
$x \mapsto 1/\operatorname{ch}^2 x$	$x \mapsto \operatorname{th} x$	\mathbb{R}
$x \mapsto 1/(a^2 - x^2)$	$x \mapsto \frac{1}{2a} \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right $	$] -\infty, -a [\text{ ou }] -a, a [\text{ ou }] a, +\infty [$
$x \mapsto 1/(a^2 + x^2)$	$x \mapsto \frac{1}{a} \operatorname{Arctan}(x/a)$	\mathbb{R}
$x \mapsto 1/\sqrt{a^2 - x^2}$	$x \mapsto \operatorname{Arcsin}(x/a)$	$] -a, a [$
$x \mapsto 1/\sqrt{x^2 - a^2}$	$x \mapsto \ln x + \sqrt{x^2 - a^2} $	$] -\infty, -a [\text{ ou }] a, +\infty [$
$x \mapsto 1/\sqrt{a^2 + x^2}$	$x \mapsto \ln (x + \sqrt{a^2 + x^2})$	\mathbb{R}

Dans ce tableau, $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, $p \in \mathbb{Z} \setminus \{0, -1\}$. Les fonctions complexes suivantes sont définies sur \mathbb{R} et leurs primitives sont valables sur cet intervalle.

Fonction	Primitive
$x \mapsto \operatorname{e}^{\alpha x}$	$x \mapsto \frac{1}{\alpha} \operatorname{e}^{\alpha x}$
$x \mapsto 1/(x - \alpha)$	$x \mapsto \ln x - \alpha + i \operatorname{Arctan} \left(\frac{x - \operatorname{Re}(\alpha)}{\operatorname{Im}(\alpha)} \right)$
$x \mapsto (x - \alpha)^p$	$x \mapsto (x - \alpha)^{p+1}/(p + 1)$